

INFERMIERE³

Innovazione, Sfide e Soluzioni

La giusta combinazione per governare la complessità

20-22 MARZO 2025 - PALACONGRESSI DI RIMINI

TERZO CONGRESSO NAZIONALE

Federazione Nazionale Ordini Professioni Infermieristiche



Indagine nei pazienti portatori di stomia intestinale sul livello di self-care e della qualità della vita a 30 giorni dalla dimissione

Autori e affiliazioni

Valentina Di Gravio, Infermiera di ricerca - UOC Anestesia, rianimazione, terapia intensiva e tossicologia clinica


Miriam De Rinaldis, Coordinatrice SITRA - Dipartimento scienze della salute della donna e del bambino e di sanità pubblica

Rosella Venturini, Coordinatrice Infermieristica - UOC Ginecologia oncologica

Claudia Pizzolorusso, Infermiera - UOC Medicina generale e dell'invecchiamento

Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS

Obiettivo Primario:
valutare la potenziale associazione tra il self-care e la qualità della vita



Obiettivo Secondario:
individuare i fattori che potrebbero influenzare il self-care e la qualità della vita

Studio osservazionale prospettico monocentrico

Scale utilizzate per la raccolta dati:

The Ostomy Self-Care Index (Villa, Vellone, Sciara et al., 2018) composto da 32 items.

The Stoma Care Quality Of Life Scale (Canova, Giorato, Roveron, Turrini, Zanotti, 2013) composta da 20 items.



Risultati Parziali per 10 pazienti

Variable	N	
Genere		
Maschi	30%	
Femmine	70%	
Età media		
	67,2	
The Ostomy Self-Care Index		
Maschi	90	Score TOT da 31 a 165 punti, punteggi elevati indicano un alto livello di self-care
Femmine	112	
The Stoma Care Quality Of Life Scale		
Maschi	40	Score TOT da 20 a 80 punti, punteggio elevato indica migliore qualità della vita
Femmine	55	

